

安全に
使うための

ちょ れい とう 猪苓湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に猪苓湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 尿が出にくい
- 残尿感がある
- むくみ
- 排尿痛
- 頻尿

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

ゼラチンに対してアレルギーがありますか？

いいえ

はい



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

【参考事項】

- ・上記の症状に加え、口渇を感じることもある方に特に適した処方です。

【排尿異常に使用される代表的な処方】

猪苓湯、五淋散、清心蓮子飲、五苓散、牛車腎気丸、八味地黄丸

効能・効果

体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渴くものの次の諸症：排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------|---------|
| ウチダの猪苓湯エキス散 | ウチダ和漢薬 | 猪苓湯エキス錠〔大峰〕 | 大峰堂薬品工業 |
| 「クラシエ」漢方猪苓湯エキス錠 | クラシエ薬品 | 猪苓湯「タキザワ」 | タキザワ漢方廠 |
| JPS猪苓湯エキス錠N | ジェーピーエス製薬 | チョレインV「コタロー」(猪苓湯エキス錠) | 小太郎漢方製薬 |
| 錠剤 猪苓湯 | 一元製薬 | ツムラ漢方猪苓湯エキス顆粒A | ツムラ |
| 猪苓湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬 | ホノミボウネツ錠 | 劑盛堂薬品 |
| 猪苓湯エキス顆粒KM | カーヤ | 本草猪苓湯エキス顆粒-M | 本草製薬 |
| 猪苓湯エキス〔細粒〕42 | 松浦薬業 | ワクナガ猪苓湯エキス細粒 | 湧永製薬 |
| 猪苓湯エキス散〔勝昌〕 | 東洋薬行 | | |

使用上の注意 (平成 25 年 10 月現在)

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

猪苓、茯苓、滑石、沢瀉、阿膠

猪苓湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない