



どっ かつ かつ こん とう

独活葛根湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に独活葛根湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に麻黄を含む漢方薬** を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？
 四十肩、五十肩 寝ちがえ 肩こり

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

心臓に不具合はありますか？
 血圧はひどく高いですか？
 (男性の方) 尿の出に不具合がありますか？
 胃腸が弱いですか？
 汗をかきやすいですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか？またはひどく虚弱ですか？

中等度/やや虚弱

ひどく虚弱/充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください
** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力中等度又はやや虚弱なもの次の諸症：四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

顧痛（エキス顆粒）	建林松鶴堂	独活葛根湯エキス錠クラシエ	クラシエ薬品
ドカール「コタロー」（独活葛根湯エキス錠）	小太郎漢方製薬	パスタントン顆粒	阪本漢法製薬
		ロート独活葛根湯錠	ロート製薬

使用上の注意（平成 25 年 10 月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

葛根、桂皮、芍薬、麻黄、独活、生姜、地黄、大棗、甘草

独活葛根湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	2	2	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない