

安全に
使うための

ご れい さん 五苓散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に五苓散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 水様性下痢
- 急性胃腸炎
- 暑気あたり
- むくみ
- 二日酔
- 頭痛

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

残便感があり、繰り返し腹痛を伴う便意を催す状態（しぶり腹）ですか？

いいえ

はい

服用できません
医療機関への受診をおすすめします

- のどが渇いて尿の量が少ないですか？
- めまいがありますか？
- 吐き気や嘔吐、腹痛がありますか？
- 頭痛がありますか？
- むくみがありますか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

急性胃腸炎、二日酔の場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりの場合には5～6日くらい服用しても症状がよくなる時は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量がすくないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

アルピタン	小林製薬	五苓散料エキス〔細粒〕16	松浦薬業
ウチダの五苓散	ウチダ和漢薬	五苓散料エキス散〔勝昌〕	東洋薬行
キアガード	ロート製薬	五苓散料「タキザワ」	タキザワ漢方廠
〔救心漢方〕五苓散	救心製薬	JPS五苓散料エキス錠N	ジェーピーエス製薬
「クラシエ」漢方五苓散料エキス顆粒	クラシエ薬品	錠剤 五苓散	一元製薬
ゴレーンN「コタロー」	小太郎漢方製薬	スイギャクEP錠	劑盛堂薬品
五苓散料A	大杉製薬	ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒	ツムラ
五苓散料Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	トチモトの五苓湯	栃本天海堂

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

沢瀉、猪苓、茯苓、蒼朮または白朮、桂皮

五苓散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	1	2	1	1

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない