

安全に  
使うための

はちみじおうがん  
**八味地黄丸の確認票**

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に八味地黄丸（八味丸）を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい →

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」 →

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に附子を含む漢方薬\*\* を服用して、気持ちが悪くなったり、のぼせたり、動悸がしたり、手足や舌がしびれたりしたことがありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」 →

服用はおすすめできません\*

次のような症状がありますか？

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 尿が出にくい | <input type="checkbox"/> 尿がもれる |
| <input type="checkbox"/> 残尿感がある | <input type="checkbox"/> 夜間尿   |
| <input type="checkbox"/> むくみ    | <input type="checkbox"/> 腰痛    |
| <input type="checkbox"/> 関節の痛み  | <input type="checkbox"/> しびれ   |
| <input type="checkbox"/> かゆみ    | <input type="checkbox"/> 耳鳴り   |
| <input type="checkbox"/> 頭重     | <input type="checkbox"/> 冷え    |

↓ 1つ以上「はい」

すべて「いいえ」 →

胃腸が弱いですか？

下痢をしやすいですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」 →

服用できません

心臓に不具合はありますか？

体力が充実していて暑がりですか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」 →

服用はおすすめできません\*



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの八味丸	ウチダ和漢薬	八味地黄丸料錠OM	大峰堂薬品工業
オオクサ八味丸	大草薬品	八味地黄丸錠「創至聖」	北日本製薬
オースギ八味地黄丸A	大杉製薬	八味地黄丸〔東洋〕	東洋薬行
クラシエ八味地黄丸A	クラシエ薬品	八味地黄丸料エキス錠N「コタロー」	小太郎漢方製薬
三宝八味地黄丸	三宝製薬	八味地黄丸料「タキザワ」	タキザワ漢方廠
サンワロン顆粒	三和生薬	花扇八味地黄丸	小西製薬
JPS八味地黄丸料エキス錠N	ジェーピーエス製薬	ホノミカツジン錠	剤盛堂薬品
腎陽温補散〔散剤〕68	松浦薬業	本草八味地黄丸料エキス錠一H	本草製薬
ツムラ漢方八味地黄丸料エキス顆粒A	ツムラ	本草八味地黄丸料エキス錠一H	大正製薬
トチモトの八味地黄丸料	柘本天海堂	蘭州金匱腎氣丸	八ツ目製薬
八味丸ダイコー	大晃生薬	蘭州金匱腎氣丸	イスクラ産業

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人には服用しないこと

- (1) 生後3ヵ月未満の乳児。
- (2) 胃腸の弱い人。
- (3) 下痢しやすい人。

### 相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

地黄、山茱萸、山茱萸、沢瀉、茯苓、牡丹皮、桂皮、加工ブシ

## 八味地黄丸の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	1	0	0

2: 最適、1: 適応可能、0: 原則としては適さない