

安全に
使うための

はんげこうぼくとう

半夏厚朴湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に半夏厚朴湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

不安神経症 神経性胃炎
 つわり せき
 しわがれ声（声がれ） のどのつかえ感

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は虚弱ですか？

中等度／充実

虚弱

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

気分が落ち込んだ感じや、ふさいだ感じがしますか？
 のどや、のどの奥にもものがつまった感じがありますか？
 めまいや吐き気がありますか？
 胃腸が弱いですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

つわりに使用する場合には、5～6日間が目安です。

症状がよくなる場合は、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの理気利心	ウチダ和漢薬	半夏厚朴湯エキス〔細粒〕51	松浦薬業
雲桂（エキス顆粒）	建林松鶴堂	半夏厚朴湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
「クラシエ」漢方半夏厚朴湯エキス顆粒	クラシエ薬品	半夏厚朴湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
JPS半夏厚朴湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	ハンゲコーン「コタロー」	小太郎漢方製薬
錠剤 半夏厚朴湯	一元製薬	ホノミアンセイ錠	劑盛堂薬品
ツムラ漢方半夏厚朴湯エキス顆粒	ツムラ	本草半夏厚朴湯エキス顆粒-M	本草製薬
トチモトの半夏厚朴湯	栃本天海堂	ハイ・コーミン	大杉製薬
半夏厚朴湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	ワクナガ半夏厚朴湯エキス細粒	湧永製薬
半夏厚朴湯エキス顆粒KM	カーヤ		

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（つわりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

半夏、茯苓、厚朴、蘇葉、生姜

半夏厚朴湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない