

安全に
使うための

ほ ちゅう エッ き とう 補中益氣湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に補中益氣湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？



いいえ



はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？



すべて「いいえ」



1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？



いいえ



はい

服用はおすすめできません*

次のような症状がありますか？

- 疲労、倦怠（けんたい）感
- 微熱、発汗（寝あせ）
- 胃腸症状や食欲不振
- こじれたかぜ症状
- 病後、術後の体力低下



1つ以上「はい」



すべて「いいえ」

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？



虚弱／わからない



充実

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません。あなたの意思により服用可能です



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

【参考事項】本剤は、次のいずれかの方に特に適しています。

- ・手足がだるい
- ・眼に勢いがない
- ・食事に味がない
- ・声に力がない
- ・口中に白い泡沫（あわ）ができる
- ・口が渴き、熱い飲食物を好む

効能・効果

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症:虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例 *

NO IMAGE	ウチダの保中回帰 ／ウチダ和漢薬	NO IMAGE	悦我「分包」 ／太虎精堂製薬	 阪本漢法の補中益気湯顆粒 ／阪本漢法製薬	JPS補中益気湯エキス錠N ／ジェーピーエス製薬
 41 ツムラ漢方補中益気湯 エキス顆粒 ／ツムラ	ツムラ漢方補中益気湯 エキス顆粒 ／ツムラ	 ホエキンN「コタロー」 ／小太郎漢方製薬	 補中益気湯Aエキス細粒 「分包」三和生薬 ／三和生薬	 補中益気湯エキス顆粒 [東洋] 分包 ／東洋薬行	
 58 補中益気湯エキス 〔細粒〕58 ／松浦薬業	補中益気湯エキス 〔細粒〕58 ／松浦薬業	 補中益氣湯エキス錠 クラシエ ／クラシエ薬品	 ホノミホイオ一錠 ／剤盛堂薬品	NO IMAGE	モリ エーポン ／大杉製薬

* 個々の商品については、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

使用上の注意

してはいけないこと

次の人には服用しないこと
生後 3 カ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1 カ月位(感冒に服用する場合には 5 ~ 6 日間) 服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

人参、白朮または蒼朮、黃耆、当帰、陳皮、大棗、柴胡、甘草、生姜、升麻

補中益気湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普段の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	0	0	0

2: 最適、1: 適応可能、0: 原則としては適さない