

安全に  
使うための

# 葛根湯加川芎辛夷の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に葛根湯（加川芎辛夷）を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことありますか？

いいえ

はい

服用できません

- 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
- 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？
- 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

- 以前に麻黄を含む漢方薬<sup>\*\*</sup>を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？
- 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用はおすすめできません\*

次のような症状がありますか？

- 鼻づまり
- 副鼻腔炎（ちくのう症）
- 粘った鼻水

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

- 心臓に不具合はありますか？
- 血圧はひどく高いですか？
- （男性の方）尿の出に不具合がありますか？
- 胃腸が弱いですか？
- 現在、たくさん汗をかいていますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」



服用できます

\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 効能・効果

更新年月: 2021年10月

比較的体力があるものの次の諸症: 鼻づまり、蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの太陽爽鼻湯(分包)	ウチダ和漢薬
オオクサ鼻優S	大草薬品
葛根湯加川芎辛夷エキス〔細粒〕77	松浦薬業
葛根湯加川芎辛夷エキス散〔勝昌〕	東洋薬行
葛根湯加川芎辛夷エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
葛根湯加川芎辛夷「タキザワ」	タキザワ漢方廠
「クラシ工」漢方葛根湯加川芎辛夷エキス錠	クラシ工薬品

サンワ葛根湯加川芎辛夷エキス細粒 「分包」	三和生薬
神農 葛根湯加川芎辛夷エキス錠	ジェーピーエス製薬
ツムラ漢方葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒	ツムラ
ノーザA「コタロー」	小太郎漢方製薬
ノンパースA	一元製薬
本草葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒-H	本草製薬
モリ チクノーン	大杉製薬

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと

生後3カ月未満の乳児。

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

葛根、麻黄、大棗、桂皮、芍藥、甘草、生姜、川芎、辛夷

## 葛根湯加川芎辛夷の体力分類に対する適応度 (服用される方の普段の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	2	2	0

2: 最適、1: 適応可能、0: 原則としては適さない