

安全に
使うための

まおうとう 麻黄湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に麻黄湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

↓ いいえ

はい

服用できません

□ 今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？

□ 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

□ 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

□ 以前に**麻黄を含む漢方薬**** を服用して、気持ちが悪くなったり、動悸がしたり、尿が出にくくなったりしたことがありますか？

□ 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

次のような症状がありますか？

□ 発熱

□ 身体のふしぶしの痛み

□ 悪寒（さむけ）

□ 鼻づまり

□ 頭痛

□ 咳

↓ 1つ以上「はい」

↓ すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

□ 心臓に不具合はありますか？

□ 血圧はひどく高いですか？

□ （男性の方）尿の出に不具合がありますか？

□ 現在、たくさん汗をかいていますか？

↓ すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

平素の体力は充実していますか、または虚弱ですか？

↓ 充実

↓ わからない

虚弱

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれません
が、あなたの意思により服用可能です

服用できません

服用できます

短期の服用にとどめ、連用しないこと

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

** 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

効能・効果

体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

一元乃錠剤 麻黄湯	一元製薬
ウチダの麻黄湯エキス散	ウチダ和漢薬
「クラシ工」漢方麻黄湯エキス顆粒 i	クラシ工薬品
阪本漢法の麻黄湯顆粒	阪本漢法製薬
サンワ麻黄湯エキス細粒「分包」	三和生薬
JPS麻黄湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬

ツムラ漢方麻黄湯エキス顆粒	ツムラ
トチモトの麻黄湯	朽木天海堂
ホノミキネツ錠	剤盛堂薬品
麻黄湯エキス〔細粒〕 59	松浦薬業
麻黄湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
ルル内服液<麻黄湯>	第一三共ヘルスケア

使用上の注意

してはいけないこと

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (2) 生後3ヵ月未満の乳児。

2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 発汗傾向の著しい人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

麻黄、桂皮、杏仁、甘草

麻黄湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	0	2	2

2: 最適、1: 適応可能、0: 原則としては適さない