



とう かく じょう き とう

# 桃核承気湯の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に桃核承気湯を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？  
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？  
 妊娠中、または妊娠している可能性がありますか？  
 現在、授乳中ですか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

以前に**大黃を含む漢方薬\*\***を服用して、腹痛や下痢を起こしたことがありますか？  
 以前に漢方薬を服用して、むくみを感じたことがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

服用はおすすめできません\*

次のような症状がありますか？  
 月経痛、月経不順  
 月経前、月経中、産後のイライラや不安  
 便秘  
 高血圧に伴う頭痛、めまい、肩こり  
 腰痛  
 痔  
 打撲傷、打ち身

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

下痢をしやすいですか？

いいえ

はい

のぼせやすいですか？  
 便秘がちですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

充実／中等度

わからない

虚弱

服用はおすすめできません\*



\* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください  
\*\* 該当する商品がわからない場合は、薬剤師または登録販売者にお尋ねください

## 効能・効果

体力中等度以上で、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難症、月経痛、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状（頭痛、めまい、肩こり）、痔疾、打撲症

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

|                     |           |                             |         |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------|
| 大峰エキス錠桃核承気湯         | 大峰堂薬品工業   | 桃核承気湯エキス顆粒KM                | カーヤ     |
| 「クラシエ」漢方桃核承気湯エキス顆粒  | クラシエ薬品    | 桃核承気湯エキス細粒〔勝昌〕              | 東洋薬行    |
| 更賜（エキス顆粒）           | 建林松鶴堂     | 桃核承気湯エキス〔細粒〕47              | 松浦薬業    |
| JPS桃核承気湯エキス錠N       | ジェーピーエス製薬 | 桃核承気湯「タキザワ」                 | タキザワ漢方廠 |
| 錠剤 桃核承気湯            | 一元製薬      | トーガックV「コタロー」<br>（桃核承気湯エキス錠） | 小太郎漢方製薬 |
| ツムラ漢方桃核承気湯エキス顆粒     | ツムラ       | トーショキン                      | 大杉製薬    |
| 桃核承気丸               | ウチダ和漢薬    | ホノミツウケツ錠                    | 劑盛堂薬品   |
| 桃核承気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬 | 三和生薬      |                             |         |

## 使用上の注意（平成25年10月現在）

### してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状             |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消化器  | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称               | 症状  |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感<br>やこわばりに加えて、脱力感、筋肉<br>痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
- 1ヵ月位（便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 本剤の服用により、予期しない出血があらわれた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

桃仁、桂皮、大黄、芒硝、甘草

## 桃核承気湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 0      | 0       | 1         | 2           | 2      |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない