

安全に
使うための

とう き しゃく やく さん

当帰芍薬散の確認票

この漢方薬を服用する人についての質問です。

以前に当帰芍薬散を服用して、気持ちが悪くなったりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたりしたことがありますか？

いいえ

はい

服用できません

今の症状、またはその他の病気で医師の治療を受けていますか？
 日常的に服用している薬や健康食品、サプリメントがありますか？

すべて「いいえ」

1つ以上「はい」

薬剤師または登録販売者に相談してください

次のような症状がありますか？

- 月経不順、月経異常、月経痛
- 頭重、肩こり、腰痛、耳鳴り
- 更年期障害
- 足腰の冷え、しもやけ
- めまい・立ちくらみ
- むくみ、しみ
- 産前産後あるいは流産による諸症状：貧血、疲労倦怠（けんたい）感、めまい、むくみ

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」

服用はおすすめできません*

平素の体力は充実していますか？または虚弱ですか？

虚弱

充実／わからない

この漢方薬はあなたの体質・症状に合わないかもしれませんが、あなたの意思により服用可能です

- 冷えを感じやすいですか？
- 貧血ぎみですか？
- 疲れやすいですか？

1つ以上「はい」

すべて「いいえ」



服用できます

* 最終的な判断は、薬剤師または登録販売者に相談して決めてください

効能・効果

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの当帰芍薬散	ウチダ和漢薬	当帰芍薬散料エキス〔細粒〕44	松浦薬業
カイケツEP錠	劑盛堂薬品	当帰芍薬散料エキス散〔勝昌〕	東洋薬行
クラシエ当帰芍薬散錠	クラシエ薬品	当帰芍薬散料「タキザワ」	タキザワ漢方廠
JPS当帰芍薬散料エキス錠N	ジェーピーエス製薬	トウシャンN「コタロー」	小太郎漢方製薬
錠剤 当芍散	一元製薬	トチモトの当帰芍薬散料	栃本天海堂
ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒	ツムラ	本草当帰芍薬散料エキス顆粒-M	本草製薬
当帰芍薬散料エキス顆粒KM-2	カーヤ	モリ エーシャン	大杉製薬
当帰芍薬散料エキス顆粒SA	帝國漢方製薬	涌出（エキス顆粒）	建林松鶴堂
当帰芍薬散料エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業	ワクナガ当帰芍薬散料エキス顆粒	湧永製薬
当帰芍薬散料Aエキス細粒「分包」 三和生薬	三和生薬		

使用上の注意（平成25年10月現在）

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

当帰、川芎、芍薬、茯苓、白朮または蒼朮、沢瀉

当帰芍薬散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	0	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない