

## 効能・効果

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

|                   |           |                 |       |
|-------------------|-----------|-----------------|-------|
| ウチダの大甘丸           | ウチダ和漢薬    | ダイカーン           | 大杉製薬  |
| オオクサ大甘丸           | 大草薬品      | 大正漢方便秘薬         | 大正製薬  |
| 紀伊国屋大黃甘草湯錠        | 紀伊国屋漢薬局   | タケダ漢方便秘薬        | 武田薬品  |
| JPS大黃甘草湯（錠剤）      | ジェーピーエス製薬 | ツムラ漢方大黃甘草湯エキス顆粒 | ツムラ   |
| 大黃甘草湯Aエキス錠三和生薬    | 三和生薬      | 東亜漢方便秘薬小粒       | 北日本製薬 |
| 大黃甘草湯エキス細粒G「コタロー」 | 小太郎漢方製薬   | 花扇大甘丸           | 小西製薬  |
| 大黃甘草湯「タキザワ」       | タキザワ漢方廠   |                 |       |

## 使用上の注意

### してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 次の症状のある人。 むくみ
  - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 消化器  | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称           | 症 状   |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 5～6日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

大黃、甘草

## 大黃甘草湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1      | 1       | 2         | 1           | 1      |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない