

効能・効果

体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症：胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの大少陽	ウチダ和漢薬	大柴胡湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
回陽（エキス顆粒）	建林松鶴堂	大柴胡湯〔タキザワ〕	タキザワ漢方廠
「紀伊国屋」大柴胡湯エキス顆粒	紀伊国屋漢薬局	ダイサインS「コタロー」（大柴胡湯エキス錠）	小太郎漢方製薬
「クラシエ」漢方大柴胡湯エキス錠	クラシエ薬品	ツムラ漢方大柴胡湯エキス顆粒	ツムラ
JPS大柴胡湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	トチモトの大柴胡湯	栃本天海堂
錠剤 大柴胡湯	一元製薬	ビスラット ゴールド	小林製薬
大柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	ホノミジッキョウ錠	劑盛堂薬品
大柴胡湯エキス顆粒KM	カーヤ	本草大柴胡湯エキス錠-H	本草製薬
大柴胡湯エキス〔細粒〕40	松浦薬業	モリ カンボールン	大杉製薬
大柴胡湯エキス散〔勝昌〕	東洋薬行		

使用上の注意

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
- 1ヵ月位（常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

柴胡、半夏、生姜、黄芩、芍薬、大棗、枳実、大黄

大柴胡湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	0	1	2

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない