

効能・効果

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの保中回帰	ウチダ和漢薬
悦我「分包」	太虎精堂製薬
JPS補中益気湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬
錠剤 補中益気湯	一元製薬
調寿（エキス顆粒）	建林松鶴堂
ツムラ漢方補中益気湯エキス顆粒	ツムラ
ホエキンN「コタロー」	小太郎漢方製薬
補中益気湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬
補中益気湯エキス顆粒KM	カーヤ

補中益気湯エキス顆粒〔東洋〕分包	東洋薬行
補中益気湯エキス〔細粒〕58	松浦薬業
補中益気湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
補中益気湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
ホノミホイオ一錠	剤盛堂薬品
モリ エーポン	大杉製薬
ロート補中益気湯錠	ロート製薬
ワカゲン錠	クラシエ薬品

使用上の注意

してはいけないこと

次の人には服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。
- (5) 次の症状のある人。 むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパシー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

人参、白朮または蒼朮、黃耆、当帰、陳皮、大棗、柴胡、甘草、生姜、升麻

補中益気湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普段の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
1	2	0	0	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない