

効能・効果

体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症：痔核（いぼ痔）、きれ痔、便秘、軽度の脱肛

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

一元乃錠剤乙字湯	一元製薬	オツジンス「コタロー」(乙字湯エキス錠)	小太郎漢方製薬
ウチダの天地通暢	ウチダ和漢薬	JPS乙字湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬
乙字湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	ツムラ漢方乙字湯エキス顆粒	ツムラ
乙字湯エキス顆粒KM	カーヤ	トチモトの乙字湯	栃本天海堂
乙字湯エキス〔細粒〕3	松浦薬業	南陽(エキス顆粒)	建林松鶴堂
乙字湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業	ブリザ漢方内服薬	大正製薬
乙字湯エキス錠クラシエ	クラシエ薬品	本草乙字湯エキス顆粒-M	本草製薬
乙字湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠	モリ タイゼン	大杉製薬

使用上の注意 (平成 26 年 6 月現在)

してはいけないこと

- 次の人は服用しないこと
生後 3 ヶ月未満の乳児。
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬(下剤)
- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

処方構成生薬

当帰、柴胡、黄芩、甘草、升麻、大黄

乙字湯の体力分類に対する適応度 (服用される方の普通の体力でお考えください)

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	1	2	2	1

2:最適、1:適応可能、0:原則としては適さない

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1 ヶ月位(きれ痔、便秘に服用する場合には 5 ~ 6 日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。