

効能・効果

体力中等度で、ときに脇腹（腹）からみぞおちあたりにかけて苦しく、食欲不振や口の苦味があり、舌に白苔がつくものの次の諸症：食欲不振、はきけ、胃炎、胃痛、胃腸虚弱、疲労感、かぜの後期の諸症状

日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

ウチダの小少陽	ウチダ和漢薬	小柴胡湯エキス（細粒）29	松浦薬業
オースギカンポール	大杉製薬	小柴胡湯エキス錠〔大峰〕	大峰堂薬品工業
「紀伊国屋」小柴胡湯エキス顆粒	紀伊国屋漢薬局	小柴胡湯「タキザワ」	タキザワ漢方廠
JPS小柴胡湯エキス錠N	ジェーピーエス製薬	ショウサインS「コタロー」（小柴胡湯エキス錠）	小太郎漢方製薬
錠剤 小柴胡湯	一元製薬	ツムラ漢方小柴胡湯エキス顆粒	ツムラ
小柴胡湯Aエキス細粒「分包」三和生薬	三和生薬	トチモトの小柴胡湯	栃本天海堂
小柴胡湯エキス顆粒SA	帝國漢方製薬	宝生（エキス顆粒）	建林松鶴堂
小柴胡湯エキス顆粒クラシエ	クラシエ薬品	ホノミチキョウ錠	劑盛堂薬品
小柴胡湯エキス顆粒KM	カーヤ	本草小柴胡湯エキス顆粒-H	本草製薬
小柴胡湯エキス顆粒〔東洋〕分包	東洋薬行	力湧仙	和漢薬研究所

使用上の注意

してはいけないこと

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - 高齢者。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。 むくみ
 - 次の診断を受けた人。肝臓病、高血圧、心臓病、腎臓病
 - インターフェロン製剤で治療を受けている人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（かぜの後期の諸症状に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

処方構成生薬

柴胡、半夏、生姜、黄芩、大棗、人參、甘草

小柴胡湯の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

I 体力虚弱	II やや虚弱	III 体力中等度	IV 比較的体力がある	V 体力充実
0	0	2	1	0

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない